



DSKAPI
YILDIRIM BEYAZIT
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

DAMAR İÇİ KATETER DEĞİŞİM SÜRELERİ PLANI

Revizyon No: 01

Doküman No: YBH-PL-65

Revizyon Tarihi :05.09.2011

Sayfa No:1/ 1

Yayın Tarihi: 03.07.2007

KateterTipi	Değiştirilmesi	Pansuman Değiştirilmesi	Setlerin Değiştirilmesi	İnf. Sıvı. Değiştirilme
Periferik Venöz Kateterler (PVK)	Erişkinlerde 72-96 saatten daha sık aralıklarla değiştirilmemelidir. Acil şartlarda takılan kateterlerin 48 saat içinde çekilmesi ve başka bir bölgeden takılması önerilir. Pediyatri ve yenidoğan hastalarında gerekmedikçe değiştirilmemelidir.	Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ise değiştirilmelidir. Direkt olarak kateter giriş bölgesinin görülmesini engelleyen bir pansuman varsa hergün kateter bölgesi değerlendirilmeli ve tekrar kapatılmalıdır.	Klinik olarak gerekmedikçe setler 72 saatten önce değiştirilmemelidir. Kan, kan ürünleri veya lipid emülsiyonları için kullanılan setler 24 saat içinde değiştirilmelidir.	Sıvıların asılı kalma süresi için bir kısıtlama yoktur. Lipid içeren TPN solüsyonlarının 24 saat içerisinde, kan ve kan ürünlerinin 4 saat içinde, lipid emülsiyonlarının 12 saat içinde infüzyonları bitirilmelidir.
Orta Hat Kateterleri	Öneri yok	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Periferik Arteriyel Kateterler	Erişkinlerde rutin olarak değiştirilmesi önerilmez. Transdüserler 72 saatte bir değiştirilmelidir.	Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ise değiştirilmelidir. Direkt olarak kateter giriş bölgesinin görülmesini engelleyen bir pansuman varsa hergün kateter bölgesi değerlendirilmeli ve tekrar kapatılmalıdır	72 saatte bir transdüser ile eş zamanlı olarak arter seti değiştirilmelidir.	72 saatte bir transdüser ile eş zamanlı olarak yıkama solüsyonu değiştirilmelidir.
Santral Venöz Kateterler (SVK)	Rutin olarak değiştirilmesi önerilmez	Steril transparan örtü kullanılıyor ise 7 günde, steril gazlı bez kullanılıyor ise 2 günde bir değiştirilmelidir. Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ya da kirlenmiş ise değiştirilmelidir.	Klinik olarak gerekmedikçe setler 72 saatten önce değiştirilmemelidir. Kan, kan ürünleri veya lipid emülsiyonları için kullanılan setler 24 saat içinde değiştirilmelidir.	Lipid içeren sıvılar 24 saat içerisinde bitirilmelidir, diğer sıvılar için öneri yoktur.
Pulmoner Arter Kateterleri	Rutin olarak değiştirilmemelidir.	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Umbilikal Kateterler	Rutin olarak değiştirilmemelidir.	Uygulanmaz	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Port	Kullanım sıklığına göre	Rutin uygulama	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Kalite Direktörü

Başhekim